



ARECOLINA

Estimulantes

Reg. ICA 594-DB

COMPOSICIÓN: Cada ampolleta de 5 ml contiene:
Arecolina bromhidrato 0,050 g
Excipientes C.S.P. 5,0 ml

USO EN:
Bovinos, Equinos, Porcinos y Ovinos.

DOSIS:
La dosis usual para animales grandes varía de 1/2 a 1 ampolleta, aplicada por vía subcutánea (debajo de la piel).

INDICACIONES:
Colinérgico. Indicado en la estimulación parasimpático en bovinos, equinos, porcinos y ovinos.

CONTRAINDICACIONES:
No emplear en el último tercio de la gestación ni en presencia de enfermedades cardíacas y respiratorias, cólicos espasmódicos de tipo nervioso, otros estados de intoxicación por organofosforados orgánicos y carbamatos, al igual que por el ácido cianhídrico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Subcutánea

ANTÍDOTO:
Atropina

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:
Caja de seis ampolletas por 5 ml cada una (0,05 g)



ESTIMULANTES