

Diurético y Anti-inflamatorio



DIURIDEM

Analgésicos / Anti-inflamatorios

Reg. ICA 6438-MV

COMPOSICIÓN:

Cada ml contiene:		
Triclorometiazida	10	mg
Flumetazona	0,50	mg
Excipientes C.S.P.	1	ml

USO EN:

Bovinos y Equinos.

INDICACIONES:

En bovinos para el tratamiento del edema fisiológico de la glándula mamaria y estructuras asociadas durante el post-parto y en afecciones edematosas inflamatorias y no inflamatorias de los bovinos y equinos.

DOSIS:

Bovinos	Equinos
1 ml x c/d 20 kg PV (Máx. 20 ml por aplicación), para el edema de la ubre, antes, durante o después del parto, diario, durante, 3 días máximo o a criterio del Médico Veterinario.	1 ml por 90 kg de peso, diario, durante tres días máximo o a criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.

PRECAUCIONES:

La duración total del tratamiento no debe exceder de 3 días. No debe administrarse en el último tercio de la gestación.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:

Frasco por 20 y 50 ml.



ANALGÉSICO ANTI-INFLAMATORIO