



FIPRO SPRAY

Ectoparasiticidas

Reg. ICA 7497-MV



COMPOSICIÓN:

Cada ml contiene:
Fipronil 2,5 mg
Excipientes C.S.P. 1 ml

INDICACIONES: Indicado para controlar y tratar la infestación por pulgas (*Ctenocephalides* sp.) garrapatas (*Rhipicephalus* sp. *Ixodes* sp. *Dermacentor* sp.) y piojos (*Trichodectes* sp. *Felicola* sp.) en perros y gatos. Ayuda al control de la Dermatitis Alergica producida por picadura de pulga (DAPP).

POSOLOGÍA: Para mojar la raíz de los pelos, aplicar 3 a 6 ml por kg de peso, dependiendo del tamaño del pelo (7,5 a 15 mg de producto activo por kg), osea: 2 a 4 chorros por kg de peso (frasco 250 ml), 1,5 ml c/chorro. El producto es activo hasta 3 meses contra pulgas y 5 semanas contra garrapatas, según el parásito presente en el medio ambiente del animal.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Aplicar sobre el pelo del animal desde una distancia de aproximadamente 10-20 cm, según la posología indicada. En animales de pelo largo, apartar el pelo y aplicar el producto a contra pelo, hasta el nacimiento de los pelos. Friccionar el pelo para que el producto penetre la piel. Dejar secar naturalmente. No sequen con una toalla.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Uso externo, mediante aplicación tópica.

PERIODO DE PROTECCIÓN: Contra pulgas: Perros: 2-3 meses.
• Gatos: 40 días. Contra garrapatas: 1 mes (3-5 semanas).

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No aplicar en perros menores de 8 (ocho) semanas de edad.
- Aplicar el producto en un lugar bien ventilado.
- Evitar aplicar el producto en los ojos del animal.
- Usar guantes, especialmente durante el tratamiento de un grupo de animales.
- Lavarse las manos después de usar el producto.
- No fumar, beber, o comer durante la aplicación.
- Conserve alejado del calor (producto inflamable).

OBSERVACIONES: Para evitar la reinfestación y controlar con eficacia las pulgas y las garrapatas, es importante tratar también el medio ambiente en donde viven perros y gatos usando los productos adecuados para ello.

PRIMEROS AUXILIOS: • En caso de contacto con los ojos y/o piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón durante quince minutos. • En caso de INGESTIÓN e intoxicación, beber grandes cantidades de agua; acudir al Médico y mostrele una copia de ésta etiqueta. En caso de intoxicación animal, llamar al Médico Veterinario.

RECOMENDACIONES: • No bañar al animal dentro de las 48 horas anteriores y posteriores al tratamiento. • No contaminar depósitos o corrientes de agua con el producto o sus envases vacíos, porque puede afectar adversamente los organismos acuáticos, cualquier contenido residual debe ser dispuesto acorde a la normatividad ambiental vigente.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico debe suministrar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN: Frasco de 50, 100 y 250 ml.



ECTOPARASITICIDAS