



Antimastítico



# LACTOMAST

Antimicrobiano

Reg. ICA 6958-MV

**COMPOSICIÓN:** Cada 10 ml contienen:

Espiramicina base ..... 200 mg  
Betametasona sodio fosfato ..... 4 mg  
Neomicina ..... 500 mg  
Excipientes C.S.P. .... 10 ml

**INDICACIONES:**

En vacas en el periodo de lactancia como anti-inflamatorio y para el tratamiento y control de infecciones causadas por *Streptococcus* sp., *Escherichia coli*, *Corynebacterium* sp., *Proteus* sp., *Klebsiella* sp. y *Mycoplasma* sp.

**MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:**

Ordeñar completamente, limpiar y desinfectar la ubre. Aplicar en cada cuarto la totalidad de una jeringa. Efectuar un masaje suave en la ubre, para facilitar la difusión del producto. Repetir a las 12, 24 horas o a criterio del Médico Veterinario.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Intramamaria.

**TIEMPO DE RETIRO:**

La leche producida durante el tratamiento y 120 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano. En carne no aplica.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

**PRESENTACIÓN:**

Caja de 1 Jeringas x 10 ml  
Caja de 4 Jeringas x 10 ml



ANTIMICROBIANO