



**Alivia rápidamente el dolor
y la inflamación en todos
los traumatismos
musculo-esqueléticos de
presentación aguda ó crónica**



Acción Prolongada

MELOVET

Analgésicos / Anti-inflamatorios

Reg. ICA 10154-MV

COMPOSICIÓN: Cada mL de la Solución contiene:

Meloxicam 15 mg

Excipientes c.s.p. 1 m

ADMINISTRACIÓN: Intramuscular, subcutánea o intravenosa.

INDICACIONES:

En equinos, bovinos y porcinos como analgésico y antiinflamatorio.

MODO DE USO:

Equinos: Trastornos músculo esqueléticos (No infecciosos) agudos y crónicos. Reducción del dolor pre y post operatorio ortopédica y de tejidos blandos. Tratamiento del dolor asociado con cólicos.

Bovinos: Trastornos músculo esqueléticos (No infecciosos). Reducción del dolor pre y post operatorios. Tratamiento del dolor y la inflamación asociada con infecciones respiratorias agudas. Mastitis aguda.

Porcinos: trastornos músculo esqueléticos (No Infecciosos). Reducción de dolor y la inflamación asociada con el síndrome de mastitis agalactia. Síndrome de emaciación post destete.

Cuando se trata de enfermedades relacionadas con agentes infecciosos el **MELOVET** corresponde a un coadyuvante en el tratamiento sintomático del dolor y la inflamación asociados al cuadro clínico.

POSOLÓGIA:

Equinos: Dosis única de 0,6 mg por Kg de peso vivo por vía intravenosa lenta; equivalente a 4,0 mL por cada

100Kg de peso vivo. En caso de ser necesario, se puede administrar una segunda dosis después de 24 horas.

Bovinos: Dosis única de 0,5 mg por Kg de peso vivo por vía intravenosa lenta o subcutánea; equivalente a 3,3 mL por cada 100Kg de peso vivo. En caso de ser necesario, se puede repetir la dosis durante 3 a 5 días.

Cerdos: Dosis única de 0,4 mg por Kg de peso vivo por vía intramuscular; equivalente a 2,6 ml por cada 100 Kg de peso vivo. En caso de ser necesario, se puede administrar una segunda dosis después de 24 horas.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 15 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 120 horas después de finalizado el mismo no deben darse al consumo humano.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES:

No administrar en especies diferentes a las indicadas. • No usar en animales severamente deshidratados, hipovolémicos o hipotensos. • No administrar simultáneamente con glucocorticoides u otros AINES. • No utilizar en animales menores de una semana en el caso de los bovinos y menores de dos días en los porcinos. • No utilizar en animales con enfermedad hepática, cardíaca o renal. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml, Frasco x 30, Frasco x 50 ml, 100 ml.



ANALGÉSICO ANTI-INFLAMATORIO