



METRILAK

Antimicrobiano

Reg. ICA 6687-MV

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g contienen:
Cefapirina Benzatínica 2,63 g
Excipientes c.s.p. 100 g
La cefapirina - cefalosporina de primera generación es un antibiótico de amplio espectro con acción bactericida frente a bacterias grampositivas y gramnegativas.

INDICACIONES:

Formulación antibiótica especial para uso intrauterino de amplio espectro, con acción bactericida frente a microorganismos sensibles a cefapirina causantes de endometritis como el *Actinomyces piogenes* y bacterias anaeróbicas gram negativas como el *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides sp.* Para el tratamiento de metritis sub-aguda y crónica de las vacas en el periodo de post-parto.

MODO DE ACCIÓN:

La cefapirina resiste la acción de la penicilinas producida por los estafilococos, y es activa en el medio ambiente uterino anaerobio. Después de un solo tratamiento con METRILAK®, las concentraciones de cefapirina en el tejido endometrial se mantienen por encima de la concentración inhibitoria mínima (MIC) de las bacterias sensibles durante al menos 24 horas. La suspensión se tolera bien, lo que permite una buena difusión de la cefapirina en el endometrio y se puede aplicar con facilidad. Formulación antibiótica especial para uso intrauterino de amplio espectro con acción bactericida frente a bacterias gram (+) y gram (-) para el tratamiento de la metritis sub-aguda y crónica de las vacas en el periodo de post-parto.

TIEMPO DE RETIRO:

Leche: NO tiene tiempo de retiro. Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 48 horas después de finalizado el tratamiento.

PRECAUCIONES: No aplicar en hembras gestantes.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Se introduce el contenido de la jeringa en el lumen uterino mediante el catéter desechable que se proporciona con la misma. Montar el catéter en la jeringa. Por vía rectal con la mano enguantada, agarrar el cérvix. Introducir el catéter en el lumen uterino a través del cérvix con movimientos oscilatorios suaves del mismo. Inyectar el contenido de la jeringa en el lumen uterino. Generalmente basta con un tratamiento para obtener una curación completa. En caso necesario, se puede repetir el tratamiento a los 14 días.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:

Caja 10 jeringas x 19 g + 10 catéteres
+ 10 guantes desechables



ANTIMICROBIANO