




TERMINATOR

Ectoparasitidas

Reg. ICA 3002-DB

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contienen:
Cipermetrina técnica 100% 15,0 g
Excipientes C.S.P. 100 ml

USO EN: Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos y Aves.

INDICACIONES En Bovinos para el control de las garrapatas *Boophilus microplus* y *Amblyomma cajanense* y de las moscas *Stomoxys calcitrans*, *Lyperosia irritans*, mosca doméstica.

DOSIS: Debido al efecto residual de **TERMINATOR**, los baños se deben practicar así: • Para *Boophilus microplus* cada 21 días. Para *Amblyomma* cada 7 días. • Para *Stomoxys* cada 20 días. Para *Lyperosia* cada 20 días. • La dilución de 1 litro de **TERMINATOR** en 1000 litros de agua se usa en baños de aspersión o de inmersión. La recarga de los baños, requiere una dilución de 1,5 litros de **TERMINATOR** por cada 1000 litros de agua.

PRECAUCIONES: * Usar guantes cuando se vaya a aplicar el producto. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua caliente y llamar al médico. * No fumar ni comer mientras se manipula el producto. Producto nocivo para los peces y las abejas. No contaminar las fuentes de agua. * No almacenar al tiempo con alimentos o medicamentos. * Después de usar el contenido del producto, enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación. Luego destrúyalo. * En caso de intoxicación humana, llamar inmediatamente al Médico. * En caso de intoxicación animal, llamar al Médico Veterinario. * Tratamiento sintomático, la cipermetrina no tiene antídoto específico. * En caso de intoxicación, llame al médico inme-

diatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela una copia de esta etiqueta. * Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua potable. * El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí mencionados de acuerdo con las indicaciones de empleo. * No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa y/o a algún excipiente. * No tratar animales de menos de 1 mes de edad. * Tratar a los animales jóvenes por separado. * No tratar a los animales con heridas o llagas abiertas. * Evitar el contacto con los ojos del animal. * No utilizarlo dentro de la zona del ordeño o donde pueda originarse una contaminación del agua. **Personas** * Las personas con hipersensibilidad conocida a la cipermetrina o a alguno de los excipientes deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario. * El tratamiento debe realizarse en recintos bien ventilados o al aire libre. * Usar un equipo de protección personal consistente en gafas, mascarillas, ropa protectoras, guantes (de nitrilo desechables) y botas de goma al manipular el medicamento. **Medio ambiente** * Es tóxica para los insectos coprófagos del estiércol.

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 48 horas después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no deberá darse al consumo humano.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Baños de aspersión o inmersión.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN: Frasco de 20, 120, 500 y 1000 ml



ECTOPARASITICIDAS