



TILCOX 40% PORCÍCOLA

Antimicoplasmico

Reg. ICA 8574-MV

COMPOSICIÓN: Cada 100 g de polvo oral contiene:
Tilmicosina Fosfato 40g
Excipientes c.s.p. 100g

INDICACIONES:

En pollo de engorde: para el tratamiento de infecciones causadas por: *Mycoplasma* sp., *Pasteurella* sp., *Ornithobacterium rhinotracheale*.

DOSIS:

En pollo de engorde: Administrar a razón de 5 g de Tilmicosina 40% por cada 10 litros de agua de bebida. Con esta cantidad se tratan al día 100 aves con un peso vivo de 1 kg. (aporta 15 a 20 mg por kg de peso vivo) durante 5 días seguidos, o a criterio del médico veterinario.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 7 días después de finalizado tratamiento.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, disuelto en el agua de bebida.

PRECAUCIONES:

No es para uso humano. Almacenar en un lugar fresco y seco protegidos de la luz solar. No administrar en aves ponedoras cuyos huevos sean destinados al consumo humano. No administrar en especies diferentes a las indicadas. Cuando lo manipule use guantes y elementos de protección, debe lavarse las manos con agua y jabón, después de haber manipulado el producto. Durante el tiempo del tratamiento, únicamente suministre agua medicada.

PRESENTACIÓN:

Bolsa de 250, 500 y 1000 g.



ANTIMICOPLASMICO