




**Antibiótico Bactericida
de Amplio Espectro**



TILOVET

Antimicrobiano

Reg. ICA 8550-MV

COMPOSICIÓN: Cada 1.0 mL contiene:
Tilosina Base 200.0 mg
Excipientes csp. 1.0 mL

INDICACIONES: **Bovinos:** neumonía, septicemia hemorrágica (fiebre del embarque). Acción sobre *Pasteurella multocida*, *Corynebacterium pyogenes* y los gérmenes sensibles de la pododermatitis necrótica. Para mastitis agudas causadas por *Streptococcus* spp y *Staphylococcus* spp, Metritis. Reduce la incidencia de abscesos hepáticos por *Fusobacterium necrophorum* y *Actinomyces pyogenes*. **Cerdos:** acción sobre neumonía enzoótica, *Pasteurella multocida* y *Corynebacterium pyogenes*, erisipelas causadas por *Erysipelothrix rhusiopathiae*, rinitis atrófica y disentería porcina, actúa sobre la artritis causada por *Mycoplasma hyosynoviae* y *Staphylococcus* spp. **Cabras y ovejas:** actúa sobre formas agudas de agalactia contagiosa causada por *Mycoplasma agalactiae* y sobre la pleuroneumonía originada por *Mycoplasma mycoides* var. capri.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Por Vía Intramuscular

POSOLOGÍA:

Cerdos: 1 ml por cada 10 a 20 KPV. (5 a 10 mg por KPV.), por día, durante 3 días.
Bovinos, ovinos y caprinos: 1 ml cada 20 a 40 KPV. (5 a 10 mg KPV.), por día, durante 5 días.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 15 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 96 horas de finalizado el tratamiento no debe darse al consumo humano ni a la industrialización.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:

- Está contraindicada en animales sensibles al principio activo.
- En el sitio de aplicación puede producirse una ligera reacción local y dolor.
- Administrar con precaución en lechones, puede causar edema de la mucosa rectal, protusión, diarrea y prurito en algunos lechones. Se recomienda en esos casos suspender el tratamiento.
- En casos de sobredosis, puede causar la muerte.
- No administrar en equinos y otros solípedos.
- No aplicar más de 10 ml en un mismo sitio de inyección.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz. La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

PRESENTACIÓN:

Frasco por 50, 100, y 250 mL.



ANTIMICROBIANO