




TRIMEBAC

Antimicrobiano

Reg. ICA 6512-MV

COMPOSICIÓN:

Cada ml contiene:

Trimetoprim	80 mg
Sulfadiazina	400 mg
Excipientes C.S.P.	1 ml

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Porcinos: 25 mg / 4 kpv, Aves: 25 mg de la asociación x 1kg día, adminístrese por 5 días consecutivos. En la práctica:

ESPECIE	EDAD	TRIMEBAC	TIEMPO
Aves: Pollos, Pavos	1 día de nacidas a 3 semanas	1 ml por cada 3 litros de agua	3 a 5 días
Pollonas Ponedoras	4 a 5 semanas	1 ml por 2.5 litros de agua	3 a 5 días
Cerdos:	Directa- mente en la boca	1 ml por cada 16 kg de peso o 10 ml por cada 15 litros de agua	3 a 5 días
		2 ml por 32 kg en una sola toma direc- tamente en la boca	3 a 5 días

INDICACIONES:

En pollos, pollas de remplazo, pavos y cerdos para el tratamiento de infecciones causadas por: *Escherichia coli*, *Haemophilus gallinarum*, *Pasteurella s.p.*, *Streptococcus s.p.*, *Staphylococcus s.p.*

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar vía oral (en el agua de bebida).

PRECAUCIONES:

No administrar en Aves en periodo de postura.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 5 días después de finalizado el tratamiento.

PRESENTACIÓN:

Caja de 12 goteros x 10 ml
Frasco de 50, 100, 500 y 1000 ml.



ANTIMICROBIANO