



VIMEC L.A.

Endo-Ectoparasiticidas

Reg. ICA 4778-DB

COMPOSICIÓN:

Cada 1 ml contiene:
Ivermectina 10 mg
Excipientes C.S.P. 1 ml

USO EN:

Bovinos y Porcinos

DOSIS:

Bovinos: 1 ml de VIMEC L.A. x 50 kg /PV

Porcinos: 1 ml de VIMEC L.A. x 33 kg /PV

Alpacas: 1 ml de VIMEC L.A. x 50 kg /PV

INDICACIONES PARA BOVINOS:

VIMEC L.A., es efectivo en el tratamiento de parásitos gastrointestinales y pulmonares: *Ostertagia ostertagi* (incluso formas inhibidas), *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus* sp., *Cooperia* sp., *Bunostomum phlebotomum*, (adultos), *Strongyloides papillosus* (adultos), *Toxocara vitulorum* (adultos), *Dictyocarus viviparus* (incluso formas inhibidas). Tratamiento de ectoparasitos: *Dermatobia hominis*, *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*, *Sarcoptes scabiei* var. bovis. Ayuda al control del: *Damalinia bovis*, *Chorioptes bovis* y *Rhipicephalus microplus*.

INDICACIONES PARA PORCINOS:

VIMEC L.A. es efectivo en el tratamiento de parásitos internos (gastrointestinales, pulmonares, renales) y externos (piojos y ácaros de la sarna). Recomendado para las formas adultas y larvarias de *Ascaris suum*, *Hyoststrongylus rubidus*, *Oesophagostomum* sp., y *Stephanurus dentatus* y para formas adultas de *Strongyloides ransomi*, *Metastrongylus*

sp., y *Trichuris suis*. Control de *Haematopinus suis* y *Sarcoptes scabiei* var. suis.

INDICACIONES PARA ALPACAS:

VIMEC L.A., es efectivo en el tratamiento de parásitos externos: *Sarcoptes scabiei* var. *Aucheniae*.

SOLUCIÓN INYECTABLE LARGA DURACIÓN: Para el tratamiento y control de parásitos internos y externos en bovinos, porcinos y alpacas contra *Haemonchus* sp., *Ostertagia* sp., *Oesophagostomum* sp., *Trichostrongylus* sp.

PRECAUCIONES:

No exponer a la luz ni temperaturas superiores a 30° C.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o subcutánea.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 42 días después de finalizado el tratamiento. No administrar en animales en producción de leche ni 42 días antes del parto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura inferior a 30°C en un lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:

Frasco por 10, 25, 50, 100 y 500 ml



ENDO-ECTOPARASITICIDAS