


Altamente Efectivo, Contra  
Parásitos Internos y Externos



# VIMEC TOP

Endo-Ectoparasiticidas

Reg. ICA 5552-DB



## COMPOSICIÓN:

Cada ml contiene:  
Ivermectina ..... 31,5 mg  
Excipientes C.S.P. .... 1,0 ml

**INDICACIONES:** Para el tratamiento y control de: Nematodos gastrointestinales: *Haemonchus* sp., *Ostertagia ostertagi*, *Trichostrongylus axei*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia* sp., *Oesophagostomum radiatum*. Parásito pulmonar: *Dictyocaulus viviparus*. Ayuda en el control de: Nuche: *Dermatobia hominis*. Ácaros de la sarna: *Psoroptes* sp. Ayuda en el control de: Garrapatas: *Rhipicephalus microplus* y Miasis: *Cochliomyia hominivorax*.

**DOSIS:** La dosis recomendada es de 1 ml de **VIMEC TOP** por cada 50 kg de peso, equivalente a 630 µg de ivermectina por kg de peso, por vía subcutánea delante o detrás de la paleta, utilizando una aguja de 15 a 20 mm, calibre 16. Utilice equipo estéril y procedimientos asépticos. AGITESE ANTES DE USAR.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:** Mantener fuera del alcance de los niños. No administrar por vía intravenosa o intramuscular. Mantener las condiciones de asepsia que caracterizan la administración de parenterales.

**CONTRAINDICACIONES:** Uso Veterinario. El producto no debe aplicarse por vía Intravenosa ni Intramuscular.

**ACTIVIDAD PROLONGADA:** El tratamiento con **VIMEC TOP**, Inyectable para bovinos también controla la re-

infestación con los siguientes parásitos internos y externos, durante el periodo de tiempo relacionado.

### Nematodos gastrointestinales:

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <i>Haemonchus</i> sp.           | 42 días |
| <i>Ostertagia ostertagi</i>     | 49 días |
| <i>Trichostrongylus axei</i>    | 42 días |
| <i>Cooperia oncophora</i>       | 42 días |
| <i>Cooperia punctata</i>        | 42 días |
| <i>Cooperia</i> sp.             | 42 días |
| <i>Oesophagostomum radiatum</i> | 49 días |

### Parásito pulmonar:

*Dictyocaulus viviparus* 63 días

### Nuche:

*Dermatobia hominis* 140 días\*

### Ácaros de la sarna:

*Psoroptes* sp. 56 días

### Garrapatas:

*Rhipicephalus microplus* 75 días

\*Periodo de tiempo durante el cual el número de lesiones observables tendrán una reducción mayor del 90%, comparadas a las de testigos sin tratamiento.

**TIEMPO DE RETIRO:** Aplicar el producto solamente por vía subcutánea. No administrar el producto a vacas en periodo de lactancia ni dentro de los 122 días antes del parto. Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 122 días después de finalizado el tratamiento.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto a temperatura ambiente a no más de 30°C. La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

### PRESENTACIÓN:

Caja x 12 frasco por 10 ml,  
frascos por 25, 50, 100, 250 y 500 ml.



ENDO-ECTOPARASITICIDAS