



**“Eficacia antibacteriana
de amplio espectro,
confianza en cada dosis”**



FLORTIFEN ORAL 10%

Antimicrobiano

Reg. ICA 11438-MV

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO: Flortifen Oral 10% es un antibacteriano de amplio espectro a base de florfenicol, diseñado para su administración oral en aves y cerdos, indicado en el control y tratamiento de infecciones bacterianas sensibles al principio activo.

MECANISMO DE ACCIÓN: El florfenicol es un antibacteriano sintético perteneciente a la familia de los anfenicoles. • Actúa mediante la inhibición de la síntesis proteica bacteriana, uniéndose a la subunidad 50S del ribosoma. • Esta unión impide la formación del enlace peptídico durante la traducción del ARN mensajero, bloqueando la proliferación bacteriana. • Presenta un efecto bacteriostático con capacidad bactericida en altas concentraciones frente a microorganismos sensibles.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Cada 100 mL de solución oral contienen:

Florfenicol..... 10 g
Excipientes C.S.P..... 100 mL

INDICACIONES: Indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas causadas por agentes sensibles en Aves (Pollos de engorde): *Escherichia coli*, *Bordetella* sp., y *Pasteurella* spp y en Porcinos (Lechón, levante y ceba): *Pasteurella* spp.

ESPECIE DE DESTINO: Porcinos y Aves.

DOSIS: Dosis farmacológica: Aves (Pollos de engorde): Administre en el agua de bebida dosis de 20 mg – 30 mg de Florfenicol por Kg de peso vivo. Duración del tratamiento 5 días. Porcinos: Administre en agua de bebida dosis de 10 mg de Florfenicol por Kg de peso vivo. Duración del tratamiento 5 días. Dosis práctica: Aves (Pollos de engorde): Administre 0,2 – 0,3 mL de FLORTIFEN ORAL 10%/Kg de peso/día. Duración del tratamiento 5 días. Porcinos: Administre 0,1 mL de FLORTIFEN ORAL 10%/Kg de peso/día. Duración del tratamiento 5 días. Tener en cuenta la siguiente ecuación para llevar a cabo la dosificación del producto:

$$\frac{\text{mL de medicamento veterinario por litro de agua de bebida}}{\text{mL de FLORTIFEN ORAL 10\% / kg de peso / día} \times \text{X Peso (Kg) vivo promedio del animal}} = \text{Promedio del consumo de agua (L) por animal}$$

PREPARACIÓN DE LA DILUCIÓN: Adicionar la cantidad de producto según la cantidad de animales a tratar y disolver en una fracción de agua de

bebida a administrar, luego completar el total de volumen indicado, este volumen deberá corresponder al promedio del consumo de agua diario estimado según edad y peso.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, en agua de bebida.

PRECAUCIONES: • Suministrar el producto Flortifen Oral 10% en agua potable a una temperatura de 10°C a 15 °C. La administración del producto deberá realizarse en bebederos destinados únicamente para el tratamiento de los animales enfermos y así garantizar una correcta dosificación. Evitar la administración del producto en agua clorada, tener en cuenta que factores como el pH alto del agua, la dureza del agua y el material del tanque, pueden influir en la estabilidad de la solución, conduciendo a una disminución de su potencia. • Se puede presentar inapetencia transitoria durante el tratamiento. • Si no se observan signos de mejoría tras tres días de tratamiento, debe revisarse el diagnóstico y, en caso necesario, cambiarse el tratamiento. • En caso de ingesta insuficiente de agua, administrar un tratamiento alternativo parenteral. • El agua de bebida medicada, debe renovarse cada 24 horas. • El sistema de suministro de agua debe limpiarse apropiadamente después de finalizar la medicación para evitar la ingesta de cantidades sub-terapéuticas de la sustancia activa.

TIEMPO DE RETIRO: Aves: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta veinte (20) días después de finalizado el tratamiento. No utilizar en aves de postura cuyos huevos se destinen a consumo humano. Porcinos: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta veintiocho (28) días después de finalizado el tratamiento.

ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura inferior a 30°C resguardado de la luz. La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: • No administrar en animales con sensibilidad al principio activo. • No administrar en animales con alteración hepática o renal, deshidratados o hipovolémicos por el riesgo de desarrollar toxicidad renal. • No administrar en hembras en estado de gestación o lactancia. • No administrar en animales reproductores.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: No administre de manera concomitante con otros antibióticos. No administrar Florfenicol con vacunas.

RESENTACIÓN: 12 goteros x 10 mL, frasco x 1000 mL.



ANTIMICROBIANO