



"El escudo
que tu mejor
amigo merece".



PETSHIELD

Antiparasitarios

Reg. ICA 11459-MV

FORMA FARMACÉUTICA: Tableta masticable.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

COMPOSICIÓN: Fluralaner

INDICACIONES: Este medicamento está diseñado para el tratamiento y control de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*) y garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*, *D. variabilis* y *Rhipicephalus sanguineus*) en perros, actuando como insecticida y acaricida sistémico. La rápida absorción del Fluralaner a nivel intestinal permite la eliminación de estos ectoparásitos a partir de las 4 horas posteriores a la administración del producto y debido a su liberación prolongada en el torrente sanguíneo, proporciona el efecto antiparasitario por aproximadamente 12 semanas. Está indicado en perros para tratamiento de Demodicosis (*Demodex* spp.) y de Sarna sarcóptica ocasionada por *Sarcoptes scabiei* var *canis* e infestaciones por ácaros *Otodectes* spp.

ESPECIES DE DESTINO: Caninos.

DOSIS Y VÍA ADMINISTRACIÓN: Administración oral. Administrar una tableta masticable cada 12 semanas

DOSIS PRÁCTICA: TABLA DOSIFICADORA

PESO CORPORAL DEL PERRO (kg)	mg DE TABLETA MASTICABLE
Para perros muy pequeños (2 - 4,5 kg)	112,5 mg
Para perros pequeños (>4,5 - 10 kg)	250 mg
Para perros medianos (>10 - 20 kg)	500 mg
Para perros grandes (>20 - 40 kg)	1000 mg
Para perros muy grandes (>40 - 56 kg)	1400 mg

DOSIS FARMACOLÓGICA: 25- 56 mg Fluralaner/kg de peso vivo dentro de cada rango de peso. Para perros con un peso corporal superior a 56 kg, se recomienda utilizar una combinación de dos tabletas masticables que coincidan lo más posible a su peso corporal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: • Durante la manipulación del producto, es esencial no comer, beber ni fumar. • Lávese las manos con abundante jabón y agua antes y después de utilizar el producto. • La administración puede provocar síntomas gastrointestinales leves y transitorios tales como diarrea y/o vómito. De presentarse estos síntomas posteriores a la administración de la tableta masticable, consultar con el médico veterinario si se

puede volver a administrar el medicamento. • Usarse con precaución en pacientes con antecedentes convulsivos, epilepsia preexistente u otros trastornos neurológicos ya que puede potenciar la aparición de estos. • Gestación y lactancia: No se ha demostrado la seguridad de PETSHIELD para su administración en perros gestantes, durante la reproducción y en periodos de lactancia.

REACCIONES ADVERSAS: En reportes espontáneos, se han notificado algunas reacciones neurológicas adversas tales como temblores musculares/ataxia y convulsiones en perros, así como, también se ha notificado en algunos estudios que la administración de Fluralaner puede provocar síntomas gastrointestinales leves y transitorios tales como diarrea y/o vómito. No obstante, las reacciones adversas reportadas fueron de corta duración. La mayoría de los perros tratados con Fluralaner no experimentaron efectos secundarios graves. De hecho, estudios clínicos han demostrado que muchas mascotas toleran bien el tratamiento con Fluralaner, sin embargo, es esencial seguir las recomendaciones del médico veterinario en cuanto a la dosis y la administración de este medicamento. Si observa alguna reacción adversa en su mascota después de administrar Petshield, es importante ponerse en contacto con su veterinario de inmediato para recibir orientación y atención adecuada.

RECOMENDACIONES: Se recomienda administrar una tableta masticable de Petshield cerca de la hora de comer. En caso de que el perro no acepte la tableta voluntariamente, es posible administrarla con la comida y luego verificar que haya sido ingerida adecuadamente. Para lograr un control óptimo de la infestación de pulgas y garrapatas, se recomienda administrar una tableta masticable de Petshield en un intervalo de 12 semanas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar a una temperatura inferior a 30°C. La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

INTERACCIÓN: Fluralaner es activo que se encuentra altamente unido a proteínas plasmáticas y podría competir con otros principios activos con afinidad a proteínas tales como los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y warfarina (derivado de cumarina).

CONTRAINDICACIONES:

- No utilizar en perros menores de 8 semanas de edad o con peso inferior a 2 kg.
- No administrar el medicamento antes de que hayan transcurrido al menos 8 semanas después de la última dosis.
- No se debe administrar el producto en perros con antecedentes de hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes del medicamento o que hayan experimentado reacciones adversas previas a productos que contienen Fluralaner.
- No administrar en gatos.

PRESENTACIÓN: Caja Display x 6 Und.

Caja 1 Blister de 1 Tab. x 112,5 - 250 - 500 - 1000 - 1400 mg



ANTIHELMÍNTICO