ANTISARNA
(Concentrado emulsionable)



MEDICAMENTOS PEQUEÑOS ANIMALES VETERINARIOS

AMITRAZ 3%

Ectoparasiticidas

Reg. ICA 6087-MV

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contienen:
Amitraz ..... 3 g
Excipientes C.S.P .....100 ml

INDICACIONES:
AMITRAZ, se utiliza para el control de Sarna *Sarcóptica (Sarcoptes scabiei)* demodecica (*Demodex foliculorum)* en caninos.

POSOLOGÍA:
Antes de hacer el tratamiento, el pelo del animal debe estar completamente seco. Dilución: Mezcle el contenido de un frasco (120 ml) en 6 litros de agua y bañe completamente el perro en esta dilución. Asegúrese de que la piel del animal se humedezca bien. Una vez aplicada la dilución déjela secar sobre el animal. No enjuague. Se recomienda 3 a 4 tratamientos con intervalos de 10 a 14 días. La dilución debe prepararse máximo 48 horas antes de su uso. Antídoto: No hay antídoto específico.

PRECAUCIONES:
• En caso de intoxicación del animal llame al Médico Veterinario. • En caso de intoxicación o ingestión accidental, llame o lleve el paciente al médico inmediatamente, muéstrele una copia de esta etiqueta. Retire el paciente del área contaminada. Con abundante agua lave las partes del cuerpo que hayan sido expuestas. Si el paciente vomita, voltéelo sobre uno de sus lados para asegurarse que pueda respirar bien. • Mantenga el envase bien tapado y en lugar fresco. • El contenido de este envase se degrada por la humedad y aire. • El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta, mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines mencionados de acuerdo con las indicaciones de empleo. • No reutilice el envase, elimínelo después de usar el producto.

CONTRAINDICACIONES:
En perros, la raza Chihuahua es severamente afectada por el AMITRAZ dada su intolerancia a este. Pueden verse síntomas como vómito y marcada depresión posteriores a la aplicación del producto, efecto que puede durar hasta 3 días. Debe prestarse particular atención a esta raza y efectuar tratamiento sintomático en caso de intoxicación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura entre 15ºC a 30ºC en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:
Frasco de 50, 120 y 500 ml.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM