

AMITRAZ

Ectoparasiticidas

Reg. ICA 3627-DB

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Amitraz ..... 12,5 g
Excipientes C.S.P. ..... 100 ml

USO EN: Bovinos.

INDICACIONES: Control de las garrapatas comunes del ganado bovino: Boophilus microplus y Amblyomma cajenennse.

DOSIS: Sólo se debe aplicar mediante baño de aspersión (manga rociadora, bombas de espalda, bombas de mano) la dilución aconsejada es de1:600 o sea mezclando 1 litro del producto en 600 litros de agua, aproximadamente con 4 a 5 litros de esta dilución se baña un animal adulto. La dilución debe prepararse en el momento del baño, puesto que la solución se degrada en un término de 48 horas.
Pequeños volúmenes de uso podrán prepararse así:
17 ml del producto en 10 litros de agua.
33 ml del producto en 20 litros de agua.
166 ml del producto en 100 litros de agua.
Para el control de garrapata Boophilus los animales se deben bañar cada 21 días. Para el control de la garrapata Amblyomma. bañar cada 8 días.
El producto está indicado sólo en ganado bovino y en baños de aspersión (no inmersión) en dilución de 1:600, para el control de Boophilus y Amblyomma.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Aplicar mediante baño de aspersión (manga rociadora, bombas de espalda, bombas de mano).

PRECAUCIONES: Use guantes de caucho para el manejo del producto. • Evite el contacto directo del producto con la piel y ojos. Si esto sucede lávese inmediatamente con abundante agua y jabón. • Evite comer y fumar durante el manejo del producto. • El enjuague de los ojos debe hacerse mínimo por 10 minutos. • No se almacene junto a alimentos, drogas, cocinas o alacenas. • No contamine quebradas, lagunas, pozos, ríos y en general fuentes de agua. • Entierre el envase desocupado, lejos de corrientes o fuentes de agua. • No aplicar a bovinos menores de 3 meses. • Los envases que hayan contenido plaguicidas no deben usarse para conservar agua o alimentos.

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento.La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

PRIMEROS AUXILIOS: El producto no tiene antídoto directo. En caso de intoxicación humana, lave las partes del cuerpo que hayan entrado en contacto con el producto. Si hubo ingestión, proceder a lavado gástrico. Llame inmediatamente al médico, y muestrele una etiqueta del producto o el envase. En caso de Intoxicación animal llame al Médico Veterinario.

RESPONSABILIDAD: "El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí mencionados de acuerdo a las indicaciones del empleo".

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura entre 15ºC a 30ºC en lugar fresco, seco y reguardado de la luz.

PRESENTACIÓN: Frasco por 33, 120, 500 y 1000 ml.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM