

ANAPLASMOL

Estimulantes

Reg. ICA 597-DB

COMPOSICIÓN: Cada ampolleta de 10 ml contienen:
Cacodilato de Sodio
Cantidad (0,87 gr de As) .....2,5 g
Sulfato de Estricnina ..... 2,5 g
Excipientes C.S.P. ..... 10 ml

USO EN:
Bovinos, Equinos, Porcinos y Ovinos.

DOSIS:
1 ampolleta de ANAPLASMOL durante 3 días seguidos. 1 ampolleta en la mañana, otra al medio día y otra en la tarde. Equivalente a 6-7 mg por kilogramo de peso vivo.

MECANISMO DE ACCIÓN:
ANAPLASMOL por su contenido especialmente Ácido cítrico, estimula la formación de hemoglobina que es la encargada de transportar el oxígeno en los glóbulos rojos, estimulando la formación de nuevas células. Estimulante del apetito.

INDICACIONES:
Reconstituyente, ideal como coadyuvante en el tratamiento de anaplasmosis en: Bovinos, ovinos y porcinos para el tratamiento de *Anaplasma marginale* y *Anaplasma ovis* y en cuadros de *babesia* en equinos, Bovinos y ovinos causadas por: *Babesia equi, Babesia Vigemina.*

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Subcutánea ó intravenosa.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura entre 15ºC a 30ºC en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:
Caja de 3 ampolletas por 10 ml cada una.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM