Controla las Garrapatas Eficazmente en sus Animales y Potreros



ATAKAR

Ectoparasiticidas

Reg. ICA 6673-MV

CONTENIDO: Cada 100 ml contienen:
Fluazuron 2,5g
(N-4-cloro-3-3-cloro-5-trifluorometil-2-pirodiniloxifenilaminocarbonil-2,6-difluorobenzamida).
Excipientes C.S.P. .....100 ml

INDICACIONES: Garrapaticida bovino. El espectro de acción incluye Boophílus microplus (Garrapata común del bovino). Actúa interfiriendo en la formación de quitina de los insectos, interrumpiendo el ciclo de vida en diferentes estadios durante las mudas y la embriogénesis. Inhibiendo la producción de huevos o se presentan a huevos inviables. Producto de acción sistémica, que se absorbe por vía transdermica.

POSOLOGÍA: La dosificación es de 2,5 mg/kg de peso vivo (5 ml por 50 kg).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Solución tópica que se aplica por derrame en la linea dorsal (**pour-on**). Realizar máximo 3 aplicaciones por año, (cada 4 meses) dependiendo del grado de infestación y exposición. No administrar antes de que transcurran 6 semanas del último tratamiento.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: "En caso de intoxicación accidental lleve inmediatamente el paciente al medico y proporcione una copia de esta etiqueta". No existe antídoto. El tratamiento es sintomático. "En caso de intoxicación del animal llamar al medico veterinario".

PRECAUCIONES:
- En algunos animales tratados puede aparecer una aspereza en el área de aplicación que generalmente desaparece de manera espontánea.
- El producto es irritante al entrar en contacto con ojos y piel. Utilizar Guantes.
- Cambiese la ropa de trabajo después de aplicar el producto.
- No coma, fume o beba mientras aplica el producto.
- "En caso de intoxicación animal llamar al medico veterinario".
- CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.
- NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de ingestión no inducir el vomito. Dar a beber grandes cantidades de agua.
- Contacto con la piel, lavar con agua y jabón mínimo 15 minutos.
- Inhalación, mover el paciente al aire fresco, si no respira, dar respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si la respiración se dificulta dar oxigeno.
- Contacto con los ojos, lavar los ojos con abundante agua, mínimo 15 minutos. Consultar al medico.

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 42 días después del tratamiento. No aplicar a vacas en producción de leche destinada a consumo humano. No realizar tratamiento con este producto a hembras gestantes durante las ultimas 6 semanas de gestación.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: No contaminar depósitos o corrientes de agua con el producto o sus envases, porque es muy tóxico para los animales acuáticos. Los envases y residuos del producto deben ser dispuestos de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN: Frascos de 100, 250, 500 y 1000 ml.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM