

DIMINAZEN

Hemoparasiticidas

Reg. ICA 3206-DB

COMPOSICIÓN: Cada frasco contiene:
Diaceturato de 4,4
Diazoamino dibenzamidina ..... 50 g
Excipientes (agua para inyección) c.s.p. ..... 1 ml

USO EN:
Bovinos, Equinos, Ovinos y Caninos.

INDICACIONES:
Está indicado para el tratamiento de la babesiosis, Tripanosomiasis y en tricomoniasis en equinos, bovinos, ovinos, y caninos así como en enfermedades producidas por: Babesia bigémina, Babesia bovis, Babesia canis, Trypanosoma vivax, Trypanosoma evansi, Trichomona sp.

ADMINISTRACIÓN:
Agregar al frasco los 19,25 ml del diluyente, para complementar a volumen a 20 ml. Mezclar bien. Para el tratamiento de la Tricomoniasis en los toros, diluir el contenido del frasco en 100 ml de agua destilada y proceder a lavar el prepucio con esta solución durante 10 a 15 minutos y repetir durante 5 días.
En equinos: dividir la dosis en tres partes, aplicar una dosis cada hora, para evitar la presentación de cólicos.
Vía intramuscular.

DOSIS:
Aplicar 7 ml de la solución por cada 100 kg de peso vivo.

TIEMPO DE RETIRO:
Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 3 días después de finalizado el tratamiento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura entre 15ºC a 30ºC en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:
Caja de un Frasco por 1 g, + diluyente por 20 ml de agua destilada

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM