*Analgésico, Anti-inflamatorio, Antipirético y Antishock.*




# FADYNE-A4

## Analgésicos / Anti-inflamatorios

*Reg. ICA 4097-DB*

**COMPOSICIÓN:** Cada ml contiene:
Flunixin meglumina ..... 83 mg
(Equivalente a Flunixin base 50 mg)
Excipientes C.S.P. ..... 1,0 ml

**USO EN:**
Bovinos, Equinos y Porcinos.

**INDICACIONES:**
Analgésico y antinflamatorio asociado con desórdenes músculoesqueléticos y cólicos en los equinos. En Bovinos como analgésico, antinflamatorio y antipirético. En Porcinos coadyuvante en el tratamiento de la inflamación, dolor y elevación de la temperatura relacionada con mastitis, metritis y desórdenes músculoesqueléticos.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**
Intravenosa o intramuscular.

**CONTRAINDICACIONES:**
Si el medicamento se usa de la manera indicada, no existen contraindicaciones.

**CARACTERÍSTICAS:**
El tratamiento es ideal para controlar el dolor, la fiebre y la inflamación.

**DOSIS:**

| | SINTOMAS | DOSIS PRÁCTICA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|---|
| Bovinos | Alteraciones musculoesqueléticas | 1x día hasta 5 días | 1 ml /45 kg IV/IM |
| | Cólicos (dolor) | | 1 ml /45 kg IV (más rápido) |
| | Colitis | 1-2 dosis cada 12 h | 2 ml /45 kg IV/IM |
| | Mastitis Aguda | 1-2 veces cada 12 h | 2 ml /45 kg IV/IM |
| | Dolor e Inflamación | 1-2 veces cada 12 h | 2 ml /45 kg IV(más rápido) |
| Porcinos | MMA (Metritis, Mastitis Agalactia) | Repetir a las 12 h si es necesario | 2 ml /45 kg IM Profunda |
| | Cojeras | Hasta 3 tratamientos cada 12 h | 2 ml /45 kg IM Profunda |

**En cada caso usar la terapia concomitante adecuada.**

**TIEMPO DE RETIRO:**
La leche producida durante el tratamiento y 48 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano. Los Bovinos, tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días después de finalizado el tratamiento. Los Porcinos, tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**
Almacenar a temperatura entre 15ºC a 30ºC en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

**PRESENTACIÓN:**
Frasco por 10, 30 y 50 ml.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM

ANALGÉSICO ANTI-INFLAMATORIO