

FENLAK

Antiparasitarios

Reg. ICA 5815-DB

COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:
Fenbendazol ..... 100 mg
Excipientes C.S.P. ..... 1 ml

USOS EN:
Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos y Caninos.

INDICACIONES:
Antihelmíntico oral de amplio espectro de acción contra los estados maduros e inmaduros de los parásitos gastrointestinales y pulmonares de bovinos, ovinos, equinos, porcinos y caninos. Bovinos y ovinos: *Haemonchus, Ostertagia, Cooperia, Nematodirus, Oesophagostomum, Bunostomum, Strongyloides, Neoascaris, Dyctiocaulus, Trichostrongylus, Moniezia.* Equinos: *Strongylus vulgaris, S. equinus, S. edentatus, Triodontophorus sp., Trichonema sp.* Porcinos: *Strongylus sp., Ascaridia sp, Strongyloides sp.* Caninos: *Ancylostoma sp., Ascaris sp., Giardia lamblia, Trichuris sp.*

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Agitar bien antes de usar. Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:
No administrar conjuntamente con los derivados bromados de salicilanilida. No usar en perros durante las etapas de gestación y lactancia.

INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS:
No administrar conjuntamente con los derivados bromados de salicilanilida.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura entre 15ºC a 30ºC en lugar fresco seco y resguardado de la luz. La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes

DOSIS:

Bovinos	Equinos	Ovinos	Porcinos	Caninos
5 ml por cada 100 KPV*	7,5 ml por cada 100KVP*	1,3 ml por cada 25 KPV*	5 ml por cada 100 KVP*	1,5 ml por cada 5 KVP*

*KPV= Kilogramo de peso vivo.

TIEMPO DE RETIRO:
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 11 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 96 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

PRESENTACIONES:
Jeringa por 20 ml
Frasco por 120, 500, 1000 ml
Garrafa por 2000 ml

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM

ANTIHELMÍNTICO