

FLORTIFEN 20%

Antibacterial

Reg. ICA 8417-MV

COMPOSICIÓN: Cada 100 g contienen:
Florfenicol ..... 20 g
Excipientes c.s.p. .... 100 g
EL FLORTIFEN 20% produce el bloqueo de la síntesis proteica al ligarse a la porción 50 S del ribosoma inhibiendo la actividad de la peptidil transferasa lo que produce la muerte bacteriana.

INDICACIÓN:
En Aves pollos de engorde, pollas de remplazo para el tratamiento de las infecciones por Escherichia coli, Pasteurella multocida, Mannhemia haemolytica, Avibacterium sp., Haemophilus sp., Streptococcus sp., Staphylococcus sp.
En Cerdos para el tratamiento de enfermedades producidas por Pasteurella sp, Actinobacillus pleuroneumoniae, Haemophilus sp.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, disuelto en el agua de bebida.

RECOMENDACIÓN:
Usar terapias de choque sumistrándo la dosis diaria en una cantidad de agua tal que se consuma en un lapso de 3 a 5 horas.

DOSIFICACIÓN:
En Aves: Debe ser administrado en el agua de bebida, en dosis de 20 a 30 mg/kg de peso por 3 – 5 dias consecutivos. Debe realizarse la pre dilución del producto, asegurando la homogenización en el agua. En la practica ½ g / litro de agua.

En Cerdos: Administrar a razón 10 g de florfenicol 20% por cada 10 litros de agua de bebida. Con esta cantidad se tratan al dia10 cerdos con un peso vivo de 10 kg. (aporta 20 mg por Kg de peso vivo) durante 7 días seguidos, o a criterio del medico veterinario.

TIEMPO DE RETIRO:
Las aves tratadas no deben sacrificarse para consumo humano hasta 5 días después de finalizado el tratamiento y los porcinos hasta 15 días después de finalizado el mismo.

PRECAUCIONES:
- No es para uso humano.
- No administrar en especies diferentes a las indicadas.
- No usar el producto en aves ponedoras, en producción de huevos para el consumo humano.
- Cuando lo manipule use guantes y elementos de protección, debe lavarse las manos con agua y jabón, después de haber manipulado el producto.
- Durante el tiempo del tratamiento, únicamente suministre agua medicada.
- No administrar en aves y cerdos destinados a la reproducción.

ALMACENAMIENTO:
- Almacenar a temperatura entre 15ºC a 30ºC en lugar fresco, seco y resguardado de la luz.
- Una vez abierto el producto consumir toda la bolsa o de lo contrario volver a sellar herméticamente
- Una vez realizada la dilución en el agua de bebida, ésta debe consumirse totalmente.

PRESENTACIÓN:
Sobres de 250 g, 500 g y 1000 g.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM

ANTIMICROBIANO