

Antibiótico de amplio espectro, IDEAL en el tratamiento de enfermedades infecciosas especialmente respiratorias.



FLORTIFEN INY.

Antimicrobiano

Reg. ICA 5028-DB

COMPOSICIÓN:

Cada ml de solución contiene:

Florfenicol 300 mg
Excipientes c.s.p. 1 mL

INDICACIONES:

En bovinos para tratar infecciones del tracto genital como Metritis, enfermedades respiratorias, cojeras, diarreas de los terneros, e infecciones ocasionadas por: *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni*, *Fusobacterium Necrophorum*, *Corynebacterium pyogenes*, *E.coli*, *Salmonellas*, *Streptococos*, *Staphilococos*, *Bacteroides nodosus* y *Bacteroides melanisingenicus*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

En porcinos: para tratar neumonías producidas por *Haemophilus parasuis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *E. coli*, *salmonella sp* y *Mycoplasma hyopneumoniae*.

DOSIS:

En Bovinos y Porcinos se aplica a 20mg/Kg de peso vivo (1 mL por cada 15 kg de peso vivo). Se debe administrar 2 inyecciones con un intervalo de 48 horas.

ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 36 días después de finalizado el tratamiento. No administrar a vacas en periodo de lactancia, cuya leche se destine al consumo humano o industrialización.

PRECAUCIONES:

No administrar más de 20 mL en el mismo sitio de inyección. Una vez abierto el frasco el producto debe utilizarse en menos de 28 días.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:

Frasco de 20, 50, 100 y 250 mL.



ANTIMICROBIANO