

FOSVIC 25%

Antibacterial

Reg. ICA 8333-MV

COMPOSICIÓN GARANTIZADA :

Cada 100 g contienen:
Fosfomicina Cálcica ..... 25 g
Excipientes c.s.p. ..... 100 g

INDICACIONES:

Para el tratamiento en aves (pollos de engorde y aves de reemplazo) de infecciones producidas por Haemophilus sp, Escherichia coli, Pasteurella sp, Staphylococcus sp, Campylobacter sp, Streptococcus sp, Shigella sp, Klebsiella sp, Proteus sp.

POSOLOGÍA:

Pollo de Engorde y Aves de Reemplazo: Administrar 13 g de Fosfomicina Cálcica 25% por cada 10 litros de agua de bebida. Con esta cantidad se tratan al día 100 aves con un peso vivo de 1 Kg. (aporta 32 mg por kg de peso vivo) durante 5 días seguidos, o a criterio del médico veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, disuelto en el agua de bebida.

PRECAUCIONES:

- No es para uso humano.
- No usar el producto en aves ponedoras, en producción de huevos para el consumo humano.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, protegidos de la luz solar.
- No administrar en especies diferentes a las indicadas.
- Cuando lo manipule use guantes y elementos de protección, debe lavarse las manos con agua y jabón, después de haber manipulado el producto.
- Durante el tiempo del tratamiento, únicamente suministre agua medicada.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 7 días después de finalizado el tratamiento.

PRESENTACIÓN:

250g, 500g, 1000g.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM

ANTIMICROBIANO