Para el tratamiento
en la deficiencia del Calcio.



HEMATURINA

Calcio y Preraraciones

Reg. ICA 2673-DB

COMPOSICIÓN: Cada sobre de 10 g contienen:

Fosfato de Calcio dibásico	7	g
(Aporta 2,06g de Ion calcio)		
Calcio gluconato	1,75	g
(Aporta 0,16g de Ion calcio)		
Calcio carbonato	0,75	g
(Aporta 0,30g de Ion calcio)		
Excipientes C.S.P.	10	g

USO EN: Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos Caninos, Gatos y Aves.

INDICACIONES:
Coadyuvante en el tratamiento de las deficiencias de calcio en aves, bovinos, caninos, equinos, gatos, ovinos y porcinos.
EN AVES: Indicación primordialmente en cuadros con marcada deficiencia de calcio. De 2 a 2,5 g por 100 Kg de peso vivo; en la práctica realizar dos choques semanales (cada tercer día) de 2 g por 100 kg de peso vivo.

DOSIFICACIÓN:
El tratamiento se recomienda establecerlo por (5) días consecutivos o a criterio del Médico Veterinario. Solubilizar la dosis adecuada de Hematurina en agua de bebida de acuerdo a la especie y el peso del animal.

ESPECIE	CANTIDAD	EQUIVALENCIA
Bovinos, Ovinos Porcinos	10 g / 100 kg PV dia	1 sobre
Caninos adultos	2 g / 10 kg PV dia	1 cucharadita dulcera
Caninos jovenes	1 g / 5 kg PV dia	1/2 cucharadita dulcera
Gatos	1 g / 5 kg PV dia	1/2 cucharadita dulcera

FORMA DE USO:
En el agua después de las cuatro de la tarde la frecuencia depende del restablecimiento de la cáscara

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Administrar por vía oral

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura entre 15ºC a 30ºC en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:
Caja dispensador por 25 sobres de 10 g cada uno.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM