

HEMODIUM

Hemoparasiticidas

Reg. ICA 3643-DB

COMPOSICIÓN:
Cada mL de solución reconstituido contiene:
Isometamidium (como Clorhidrato de cloruro de isometamidium 0,02 g) ..... 0,019 g
Excipientes c.s.p. ..... 1 mL

INDICACIONES:
En Bovinos, Ovinos y Caprinos para el tratamiento de la Tripanosomosis causadas por Trypanosoma vivax, Trypanosoma brucei brucei y T. evansi.

MODO DE EMPLEO:
HEMODIUM® se administra por vía intramuscular profunda en solución al 2%, la cual se obtiene disolviendo el contenido de este frasco en 50 ml del diluyente estéril adjunto. Se aconseja un buen masaje después de la aplicación.

DOSIS:
1 mL de la solución por cada 40 kg de peso (0,5 mg/kg), esta dosis permite una protección de 2 a 6 meses dependiendo de la actividad y sensibilidad de las cepas de Tripanosoma. En zonas de mediana a alta incidencia aplicar 1 mL de la solución por cada 20 kg de peso (1 mg/kg). La frecuencia de administración depende del criterio del médico veterinario. Administrar por vía intramuscular profunda.

PRECAUCIONES:
Reconstituir el producto inmediatamente antes de utilizarlo. No administrar más de 15 mL por sitio de aplicación. El medicamento debe ser manipulado por profesionales capacitados debido a que es probable que sea cancerígeno.

CONTRAINDICACIONES:
No aplicar por vía subcutánea. No administrar en animales con desnutrición ya que puede presentar severos efectos tóxicos.

INTERACCIONES:
Nunca debe usarse al mismo tiempo que otros medicamentos tripanocidas y deben transcurrir al menos quince días entre el tratamiento con isometamidium y cualquier otro medicamento, particularmente diminazen diaceturato. Además, después del tratamiento con diminazen diaceturato, debe haber un intervalo de al menos dos semanas antes de que se pueda administrar isometamidium.

TIEMPO DE RETIRO:
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura inferior a 30°C resguardado de la luz. Una vez reconstituido el producto conservar en refrigeración hasta 24 horas. La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

PRESENTACIÓN:
Frasco por 50 y 200 ml.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM