

Acción Hemoparasiticida
Antipirética -Antianémica

HEMOSAN

Hemoparasiticidas

Reg. ICA 9738-MV

COMPOSICIÓN:
Cada 100 mL de la solución contiene:

Oxitetraciclina dihidrato base	10	g
Diaceturato Diminacene	4	g
Antipirina	15	g
Cianocobalamina	1,5	mg
Excipientes c.s.p.	100	mL

INDICACIONES:
Esta indicado en el control y tratamiento de la anaplasmosis (Anaplasma marginale) Babesiosis (B.bigemina,B. bovis, B.canis) y Tripanosomiasis (T.Evansi,T vivax). Otras indicaciones a criterio del mèdico veterinario.

ESPECIES:
Bovinos, equinos y perros.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Se administra por vía intramuscular profunda, previa desinfección del sitio de la inyección.

DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
Se dosifica en los vacunos o equinos afectados a razón de 1 mL por cada 10 kg de peso. En equinos dividir la dosis y aplicarla en intervalos de 1 a 2 horas para evitar síntomas parecidos al cólico. Perros 1 mL por cada 12 kg de peso. En bovinos y equinos puede repetirse la dosis a las 24 horas si la fiebre persiste o a criterio del médico veterinario.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura entre 15ºC a 30ºC en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

TIEMPO DE RETIRO:
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 22 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 144 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

PRESENTACIÓN:
Frasco por 30, 50 , 100, 250 y 500 ml.

BUENAS PRÁCTICAS DE BPM MANUFACTURA