



Antimastítico



LACTOMAST

Antimicrobiano

Reg. ICA 6958-MV

COMPOSICIÓN: Cada 10 ml contienen:

Espiramicina base	200 mg
Betametasona sodio fosfato	4 mg
Neomicina	500 mg
Excipientes C.S.P.	10 ml

INDICACIONES:

En vacas en el periodo de lactancia como anti-inflamatorio y para el tratamiento y control de infecciones causadas por *Streptococcus* sp., *Escherichia coli*, *Corynebacterium* sp., *Proteus* sp., *Klebsiella* sp. y *Mycoplasma* sp.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Ordeñar completamente, limpiar y desinfectar la ubre. Aplicar en cada cuarto la totalidad de una jeringa. Efectuar un masaje suave en la ubre, para facilitar la difusión del producto. Repetir a las 12, 24 horas o a criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramamaria.

TIEMPO DE RETIRO:

La leche producida durante el tratamiento y 120 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano. En carne no aplica.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:

Caja de 1 Jeringas x 10 ml
Caja de 4 Jeringas x 10 ml



ANTIMICROBIANO