

LARVAMIX 1%

Larvicida

Reg. ICA 5221-DB

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 g de LARVAMIX 1 % contiene:

Ciromacina	1 g
Excipientes c.s.p.	100 g

INDICACIONES

Para el control de larvas de moscas: Stomoxys Calcitrans, Mosca Doméstica, Liperosia Irritans y Chrysomia sp. Usar en el alimento de gallinas ponedoras en jaula únicamente.

DOSIFICACIÓN Y RECOMENDACIONES DE USO

Se administra mezclado con el alimento balanceado a razón de 500 g/TM de alimento. Mezclar homogéneamente el producto con el alimento. El producto se comporta como un larvicida controlando las larvas de las moscas mencionadas presentes en la gallinaza de ponedoras en jaula.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

Se administra por 6 semanas continuas, luego se suprime el tratamiento por 6 semanas y posteriormente se continúa por otras 6 semanas y así sucesivamente en forma alterna.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños. Toxicidad Categoría III. MEDIANAMENTE TÓXICO CUIDADO. No administrar el producto a pollos de engorde (parrilleros) o gallinas reproductoras. Mezclar el producto usando gorro, guantes y vestimenta apropiada. En caso de ingestión o intoxicación acudir inmediatamente al médico. lavar las zonas expuestas al producto. Evitar el contacto con los ojos o mucosas. El producto no tiene antídoto por lo que su tratamiento es sintomático. En caso de Intoxicación del animal llamar inmediatamente al Médico Veterinario. Lavar los equipos que se hayan utilizado en la mezcla del producto. No agregar agua a la gallinaza ya que se diluye el principio activo. Almacenar en un lugar retirado de alimentos para consumo humano o animal. Ningún envase o empaque que haya contenido el producto deberá utilizarse para conservar alimentos o agua potable. Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase o empaque y destrúyalo. No desechar el producto, parte de él o sus residuos en vertientes de agua o nacimientos.

TIEMPO DE RETIRO

Las aves tratadas no deben sacrificarse para consumo humano hasta tres días después de retirado el producto del alimento.

DOSIFICACIÓN

Oral, se debe mezclar bien con el alimento antes de usarse. Dosificación según criterio del Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN 5 kg, 25 kg.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM

ANTICOCCIDIAL