

LEVAMISOL 15%

Antiparasitarios

Reg. ICA 2695-DB

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Levamisol Hcl ..... 15 g
Excipientes C.S.P. ..... 100 ml

USO EN:
Bovinos, Ovinos y Porcinos.

INDICACIONES:
Esta indicado en bovinos y ovinos para el tratamiento de infestaciones parasitarias ocasionadas por *Haemonchus sp., Ostertagia sp., Trichostrongylus sp., Strongyloides sp., Bunostomun sp., Nematodirus sp., Neoascaris vitulorum, Chabertia ovina, Cooperia sp., Oesophagostomum sp. y Dyctyocaulus sp.* En porcinos para el tratamiento de *Hyostrongylus sp., Ascaris sp., Oesophagostomum sp. y Metastrongylus apri.*

DOSIS:

PESO ANIMAL (Kg)	DOSIS (ml)	No. de animales que se pueden tratar con un Fco. de 100 ml
60	2	50
90	3	32
120	4	25
150	5	20
180	6	16
210	7	14

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular en bovinos, subcutánea en ovinos y porcinos.

TIEMPO DE RETIRO:
Los animal tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 3 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano. No utilizar en equinos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura entre 15ºC a 30ºC en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:
Caja de 24 Frascos x 20 ml
Frascos por 100, 250 y 500 ml

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM