

LEVAMISOL 7,5%

Antiparasitarios

Reg. ICA 1791-DB

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contienen:
Levamisol Hcl ..... 7,5 g
Excipientes C.S.P. ..... 100 ml

USO EN: Bovinos, Ovinos y Porcinos.

INDICACIONES:
En bovinos y ovinos para el tratamiento de *Haemonchus sp., Ostertagia sp., Trichostrongylus sp., Strongyloides sp., Bunostomun sp., Nematodirus sp., Neoascaris sp., Chabertia sp., Cooperia sp., Oesophagostomum sp. y Dyctyocaulus sp.* En porcinos para el tratamiento de *Hyostrongylus sp., Ascaris sp., Oesophagostomum sp. y Metastrongylus sp.*

DOSIS:

PESO ANIMAL (Kg)	DOSIS (ml)
60	4
90	6
120	8
150	10
180	12
210	14

PRECAUCIONES:
No utilizarse en equinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular en bovinos, subcutánea en ovinos y porcinos.

TIEMPO DE RETIRO:
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 3 días después de finalizado el tratamiento.
La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura entre 15ºC a 30ºC en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:
Caja de 24 Frascos x 20 ml
Frascos por 20, 100, 250 y 500 ml

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM

ANTIPARASITARIO