

MARBOVIC 25

Antimicrobiano

Reg. ICA 11238-MV

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Cada tableta recubierta de 260 mg contiene:
Marbofloxacina ..... 25 mg
Excipientes c.s.p. ..... 260 mg

GENERALIDADES FARMACOLÓGICAS: La marbofloxacina es un antimicrobiano bactericida sintético que pertenece al grupo de las fluoroquinolonas que actúa inhibiendo la ADN girasa. Resulta efectivo contra una gran variedad de bacterias grampositivas (en especial estafilococos y estreptococos) y gramnegativas (Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Morganella morganii, especies de Proteus, especies de Klebsiella, especies de Shigella, especies de Pasteurella, especies de Haemophilus, especies de Moraxella, especies de Pseudomonas, Brucella canis) así como especies de Mycoplasma.

Tras la administración oral de **MARBOVIC 25** a perros y gatos a la dosis recomendada del medicamento se absorbe fácilmente y alcanza una concentración máxima en plasma de 1,5 µg/mlen el plazo de 2 horas y su biodisponibilidad es cercana al 100%.

Se une débilmente a las proteínas plasmáticas (menos del 10%), se distribuye ampliamente y en la mayoría de tejidos (hígado, riñón, piel, pulmón, vejiga, tracto digestivo) alcanza concentraciones más elevadas que en plasma **MARBOVIC 25** se elimina lentamente en perros predominantemente en forma activa a través de la orina (2/3) y una tercera parte de a través de las heces (1/3).

INDICACIONES: Indicado en perros y gatos para el tratamiento de infecciones cutáneas (pioderma de los pliegues cutáneos, impétigo, foliculitis, furunculosis, celulitis). infecciones urinarias e infecciones respiratorias asociadas a bacterias sensibles a la marbofloxacina: Staphylococcus spp., Escherichia coli., Klebsiella spp., Pasteurella spp. y Pseudomonas spp.

ESPECIES DE DESTINO: Perros y Gatos

DOSIS: *Dosis Farmacológica:* Perros y Gatos: La dosis recomendada es 2,75 mg por Kg de peso vivo cada 24 horas. En perros, la dosis puede aumentar a 5,5 mg por Kg de peso vivo cada 24 horas. *Dosis Práctica:* Perros y Gatos: Administrar 1 Tableta por cada 9 kg de peso vivo cada 24 horas. En perros, la dosis puede aumentar a 1 Tableta por cada 4,5 kg de peso vivo cada 24 horas.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: Infecciones Respiratorias: 7 días. Dependiendo del transcurso de la enfermedad, puede alargarse hasta 21 días.

Infecciones de las vías urinarias: 10 días. Si no se nota una mejoría dentro de los primeros 5 días de tratamiento, el diagnóstico debe ser reevaluado o prolongarse hasta 28 días.

Infecciones Cutáneas: Para casos de pioderma superficial y profundo se recomienda una duración inicial del tratamiento de 21 a 28 días respectivamente, con una duración máxima de hasta 40 días que se establecerá en función de la evolución clínica del proceso. Infecciones de tejidos blandos: la duración del tratamiento debe ser por lo menos de 5 días

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Las personas con hipersensibilidad conocida a Fluoroquinolonas deben evitar el contacto con este medicamento veterinario. El pH urinario bajo podrá tener un efecto inhibidor sobre la acción de la Marbofloxacina. Se debe administrar con precaución en animales en los que se conoce o sospecha trastornos del sistema nervioso central. Se debe usar con precaución en los gatos. No usar en caso de resistencia a las quinolonas, ya que existe una resistencia cruzada (casi) completa a otras fluoroquinolonas. No es adecuado para infecciones provocadas por anaerobios estrictos, levaduras u hongos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura inferior a 30°C resguardado de la luz. La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

CONTRAINDICACIONES: No administrar en animales en estado de gestación o lactancia. No administrar en perros inmaduros (Razas pequeñas: No usar antes de los 8 meses. Razas medianas: No usar antes de los 12 meses. Razas grandes: No usar antes de los 28 meses). La Marbofloxacina está contraindicada en gatos menores a los 12 meses. La Marbofloxacina está contraindicada en perros y gatos con hipersensibilidad conocida a las quinolonas. No usar en combinación con tetraciclinas o macrólidos, ya que pueden tener un efecto antagonista.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Evitar la administración oral concomitante de Marbofloxacina con alimentos, suplementos u otras preparaciones que contengan cationes divalentes o trivalentes (sucralfatos, antiácidos y suplementos minerales).

PRESENTACIÓN:
Caja display de 12 Unidades con 1 Bliter x 10 Tabletas de 25 mg.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM