

MONEMIX 20%

Anticoccidial

Reg. ICA 7192-MV

COMPOSICIÓN Cada 100 g contienen:

Monensina Sódica	20 g
Excipientes c.s.p.	100 g

INDICACIONES

Para el control de coccidiosis en pollos de engorde y pollitas de reposición, causada por Eimeria acervulina, E. máxima, E. mivatí, E. necatrix, E. tenella y E. Brunetti.

POSOLOGÍA

Agregar 500 g del producto equivalente a 100 ppm de Monensina Sódica por tonelada de alimento para el control de la coccidiosis en pollos parrilleros y pollas de reposición hasta la semana 16 de edad.

PRECAUCIONES

- No administrar de forma directa a los animales.
- No utilizar en equinos.
- No utilizar en especies diferentes a las aves.
- No administrar a ponedoras en producción.
- Durante el tratamiento no se debe administrar alimentos o productos que contengan tiamulina para evitar efectos tóxicos severos.
- Almacenar a temperatura ambiente.
- Evite el contacto directo con la piel membranas mucosas.

TIEMPO DE RETIRO

- No administrar a aves ponedoras cuyos huevos se destinen al consumo humano.
- Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 4 días después de finalizado el tratamiento.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral en pre-mezcla con los alimentos.

PRESENTACIÓN

5 kg, 25 kg.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM