Nucherol ® Polvo Controla Nuches, Ácaros de la Sarna, Piojos, Moscas, Pulgas y Parasitos Gastrointestinales.



NUCHEROL

Control de Vectores

Reg. ICA 7555-MV

COMPOSICIÓN: Cada 100g contienen:

Metrífonato (Triclorfón) (o,o - Dimetil-2,2,2-Tricloro-Hidroxietilfosfonato)	97 g
ExcipientesC.S.P.	100 g

INDICACIONES:
BOVINOS: En el control de Haemonchus placei, Ostertagia Ostertagí, Cooperia spp, Trichostrongylus spp, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum. Larvas de Dermatobia hominis, Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans. Ácaros de la sarna: Sarcoptes scabiei var. Bovis, Psoroptes bovis, Chorioptes bovis, Demodex foliculorum, var. Bovis y piojos: Damalinía bovis, Haematopinus euryster Oesophagostomum spp. Larvas de Oestrus ovis. Ácaros de la sarna: Sarcoptes scabíei var ovis. Chorioptes ovis. Psoroptes ovis, Demodex spp y piojo como: Damalinía ovis, Linognathus stenopsis y Linognathus pedalis. **EQUINOS:** Parascaris equorum, Oxyuris equí, y larvas de Gasterophillus spp Larvas de Habronema spp Ácaros de la sarna. Sarcoptes scabíei var equi, Psoroptes equí, Chorioptes equí y piojos como: Damalinia equí. Haemotopinus asini. **PORCINOS:** Ascaris suum, Trichuris suis, Hyostrongylus spp, Oesophagostomum spp. Ácaros de la sarna: Sarcoptes scabiei var suis, Demodex foliculorum y piojos Haematopinus suis. **AVES:** Ácaros de la sarna como Dermanyssus avium, Dermanyssus gallinae y Cnemidocoptes mutans y piojos como Menopon gallinae.

DOSIS: Para: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y aves. **Aplicación externa (aspersión):** Piojos, ácaros de la sarna y moscas: 1 sobre de 15 g en 10 litros de agua (1,455 g/L Metrifonato-Triclorfon).

- Larvas (nuche, miasis, bichera): 1 sobre de 15 g en 1.5 litros de agua (9,7 g/L Metrifonato-Triclorfon).
- Otras indicaciones según criterio del médico veterinario.

Para: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos.
Aplicación interna: 1 sobre de 15 g en 150 mL de agua (97 mg/mL Metrifonato-Triclorfon), de esta solución, se administra 5 mL por cada 10 kg de peso vivo (48,5 mg/kg Metrifonato-Triclorfon) vía oral. Equinos: Administrar 3,5 mL de esta solución por cada 10 kg de peso (33,95 mg/kg Metrifonato-Triclorfon) vía oral.

- Para porcinos repetir dosis al mes en caso de presentar ectoparásitos. • Otras indicaciones según criterio del médico veterinario.

ANTÍDOTO: En los humanos, Sulfato de ATROPINA al 1%, a la dosificación de 0,2 ml (2 mg) vía intramuscular, cada hora, hasta que desaparezcan los síntomas.

PRECAUCIONES: Leer la etiqueta antes de usar el producto. En vacas de producción lechera, la aplicación del producto debe hacerse después del ordeño. No usar en hembras en el último tercio de la gestación, ni en animales débiles o fatigados y la dosis de la atropina en animales en caso de intoxicación, "según criterio del médico veterinario".

TIEMPO DE RETIRO: La leche producida durante el tratamiento y 12 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano. Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado al tratamiento.

PRESENTACIÓN:
Caja de 50 sobres x 15 g, Frasco x 200-1000 g.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM