

**Anti-microbiano  
inyectable de larga acción.**



# PANAMICINA L.A.

**Antimicrobiano**

Reg. ICA 3510-DB



**COMPOSICIÓN:** Cada ml contiene:

Oxitetraciclina dihidrato ..... 200 mg  
Excipientes C.S.P. .... 1 ml

**USO EN:**

Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Aves, Caninos y Gatos.

**INDICACIONES:**

En bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, caninos y gatos para el tratamiento de infecciones ocasionadas por: *Anaplasma* sp, *Rickettsia* sp, *Escherichia coli*, *Pasteurella* sp, *Streptococcus* sp, *Haemophilus* sp, *Leptospira* sp, *Campylobacter* sp, *Listeria* sp. y *Pasteurella multocida*.

**POSOLOGÍA:**

| Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Caninos y Gatos | Aves                                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 ml por cada 10 kg de peso vivo como dosis única.            | 50 mg / Kg (0,25 ml por Kg de peso vivo). |

Máximo volumen por sitio de aplicación: En Bovinos y Equinos 10 ml. Ovinos, Caprinos y porcinos no superior a 5 ml.

**TIEMPO DE RETIRO:**

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. No usar el producto en vacas en producción de leche. No administrar a aves en producción de huevos destinados al consumo humano.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Intramuscular. En lechones con pesos menores de 10 kg se recomienda la vía subcutánea (detrás de la oreja) a dosis de 1 ml. En aves vía subcutánea en la región posterior del cuello.

**PRECAUCIÓN:**

Las formulaciones L.A. (larga acción) de oxitetraciclina pueden ser muy irritantes en los equinos.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

**PRESENTACIÓN:**

Caja de 12 Frascos por 20 mL  
Frascos de 50, 100, 250 y 500 ml



ANTIMICROBIANO