Antisépticos, Larvicida y Repelente de Insectos de Uso externo



SANAMAX

Desinfectantes

Reg. ICA 5807-DB

COMPOSICIÓN QUÍMICA: por 100 ml de formulación:

Ingredientes activos

Clorpirifos	5	g
Aceite de pino	10	g
Aceite de citronella	3	g
Violeta de genciana	0,4	g

USO EN:

Bovinos, Equinos, Caprinos, Porcinos, Caninos, Felinos y Aves.

INDICACIONES:

Antiséptico, larvicida y repelente de insectos para uso externo.

MODO DE EMPLEO:

SANAMAX® de uso tópico exclusivamente. Dirija el orificio del atomizador hacia la superficie afectada, ejerciendo una leve presión sobre la válvula. Aplicar de arriba a abajo a una distancia no menor de 30 centímetros en el área afectada, así como 5 centímetros alrededor de la misma. Repetir el tratamiento según las indicaciones del Médico Veterinario o de acuerdo a la gravedad de la lesión. El uso frecuente y no supervisado por el médico veterinario, puede producir irritación.

Aplique SANAMAX® aproximadamente cada 10 días. El uso de este producto no afecta la capa de ozono.

PRECAUCIONES:

El ingrediente activo es colinérgico. Use atropina como antídoto. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro de salud y muestrele este envase. Trate el caso sintomáticamente.

- No se aplique cerca de los ojos o junto al fuego.
- No perfore el envase ni lo incinere.
- Conservar a temperatura ambiente (no mayor a 40 °C).
- En caso de intoxicación animal, llamar al Médico Veterinario.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 48 horas después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

PRESENTACIÓN:

Aerosol por 300 g/354 ml y 424 g/500 ml.