

SILOMIX

Anticoccidial

Reg. ICA 6986-MV

COMPOSICIÓN

Cada 100 g contienen:

Salinomicina Sódica	12 g
Excipientes C.S.P.	100 g

INDICACIONES Y USOS

Anticoccidial de amplio espectro para el control de coccidiosis en pollos de engorde y pollas de reemplazo (jaula), causada por Eimeria acervulina, E. máxima, E. mivatí, E. necatrix, E. Tenella y E. Brunetti.

POSOLOGÍA

Agregar 500 g del producto equivalente a 60ppm de Salinomicina Sódica por tonelada de alimento para el control de la coccidiosis en pollos parrilleros y pollas de reposición hasta la semana 16 de edad.

PRECAUCIONES

- Utilizarlo solo en aves donde está recomendado en el alimento, en la forma indicada y no exceder la dosis.
- No administrar en ponedoras en producción.
- No adicionar ninguna otra droga anticoccidial al alimento cuando este contenga este producto.
- El producto es INCOMPATIBLE con la TIAMULINA.
- El alimento preparado con este anticoccidial, solo debe ser suministrado a las aves para las cuales es destinado.
- No debe administrarse a otro tipo de animales.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral en pre-mezcla con los alimentos.

TIEMPO DE RETIRO

Los pollos de engorde tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 48 horas después de finalizado el tratamiento y no administrar a aves ponedoras cuyos huevos se destinen al consumo humano.

PRESENTACIÓN

5 kg, 25 kg.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM