

TETRAPLUS 20%

Antibacterial

Reg. ICA 7276-MV

COMPOSICIÓN:
Cada 100 g contienen:

Clortetraciclina Cálcica	20 g
Excipientes C.S.P.	100 g

INDICACIONES Y USOS:
En Aves pollo de engorde y pollas de levante para el control y tratamiento de enfermedades respiratorias crónicas (ERC), sinovitis infecciosas y enteritis infecciosas, producidas por Escherichia coli. Streptococcus sp. Mycoplasma sp. Haemophilus sp.Pasteurella sp. Campylobacter sp. En Cerdos para el tratamiento de enfermedades, producidas por Eschericha coli. Pasteurella sp. Campylobacter sp. Streptococcus sp. Mycoplasma sp. Haemophilus sp. Shigella sp.

POSOLOGÍA:
En Aves, Pollo de engorde y pollas de levante:
Suministrar diariamente 60 mg de ingrediente activo por kilogramo de peso vivo durante 5-7 días. En la practica administrar por tonelada de alimento según sea el caso de la siguiente forma: Tratamiento de ERC: 1.325 g a 2.625 g de producto por 5-7 días • Tratamiento de ERC y enteritis infecciosa: de 2.625 g a 5.250 g de producto • Tratamiento preventivo y curativo en sinovitis infecciosa de 2.625 g a 5.250 g de producto por 5 días.

En Cerdos administrar por tonelada de alimento según sea el caso de la siguiente forma: En enfermedades entéricas de 2.625 g a 5.250 g de producto. Tratamiento de leptospirosis 5.250 g de producto. Cerdas en gestación y lactancia de 2.625 g a 5.250 g producto por 5-7 días seguidos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral en premezcla con los alimentos.

PRECAUCIONES:
- No administrar de forma directa a los animales.
- Almacenar a temperatura ambiente.
- No administrar en ponedoras en producción cuyos huevos se destinen al consumo humano.

TIEMPO DE RETIRO:
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 15 días después de finalizado el tratamiento.

PRESENTACIÓN:
5 kg, 10kg, 25 kg.

BUENAS PRÁCTICAS DE BPM MANUFACTURA

ANTIMICROBIANO