

TRISULMIX 75%

Antibacterial

Reg. ICA 5322-DB

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 g de TRISULMIX 75% contiene:

Sulfadiazina Sodica	62.5 g
Trimethoprim	12.5 g
Excipientes C.S.P.	100.0 g

INDICACIONES

En **AVES**: Para controlar y tratar enfermedades producidas por Escherichia coli, (colibacilosis), Haemophillus gallinarum (coriza infecciosa), Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Klebsiella sp., Shigella sp. Pasteurella sp. (Colera aviar).

En **CERDOS**: Para controlar y tratar la enfermedad producida por Bordetella sp., Escherichia coli, Shigella sp., Actinobacilílus sp., Pasteurella sp., Aerobacter sp., Corynebacteríum sp., Actinomyces sp, Campylobacter sp., Streptococcus sp., Proteus sp., Staphylococcus sp., Klebsiella sp., Bordetella sp., Haemophillus sp.

DOSIFICACIÓN

AVES: Mezclar 25mg de la asociación por KPV durante 7 días. En la practica 33mg de la Trisulmix 75% / KPV. Dosificación en agua de bebida:

• Pollas de cria y levante 1g/4.5 L. • Ponedoras 1g/4.0 L • Pollos de 0 a 3 semanas 1g/4.5 L. • Pollos de 4 a 5 semanas 1g/4.5 L. • Pollos de 5 a 8 semanas 1g/4.5 L

CERDOS: 30 mg/kg P. Vivo equivalente a 1g de producto/20 kg P. Vivo/dia durante 5-10 días.

RECOMENDACIONES PARA EL USO

En aves y cerdos debe administrarse en el agua bebida.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 10 días después de finalizado el tratamiento. No administrar a aves cuyos huevos se destinen al consumo humano.

PRECAUCIONES

• Destruya el empaque después de administrar el producto.

• Evite el contacto con ojos, mucosas y piel en caso de contacto lávese con abundante agua y jabón.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura entre 15ºC a 30ºC en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN

5 kg, 10kg, 25 kg.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM

ANTIMICROBIANO