

TRISULMIX 90%

Antibacterial

Reg. ICA 5322-DB

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Cada 100 g de TRISULMIX 90% contiene:

Sulfametazina sódica (equivalente a 69,5 g de Sulfametazina base)	75 g
Trimetoprim	15 g
Excipientes c.s.p.	100.0 g

INDICACIONES:
En aves: Indicado en pollos de engorde y pollas de levante para controlar y tratar enfermedades producidas por Escherichia coli (colibacilosis), Avibacterium paragallinarum (coriza infecciosa), Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Klebsiella sp., Shigella sp., Pasteurella sp. (colera aviar).
En cerdos: Indicado para controlar y tratar la enfermedad producida por Bordetella sp., Escherichia coli, Shigella sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Corynebacterium sp., Trueperella pyogenes, Actinomyces sp., Campylobacter sp., Streptococcus sp., Proteus sp., Staphylococcus sp., Klebsiella sp., Bordetella sp., Haemophilus sp., Glaesserella parasuis.

ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO: Aves y cerdos.

DOSIS VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Dosis farmacológica: Para uso en agua de bebida o en el alimento a razón de 25 mg/kg de Sulfametazina sódica y 5 mg/kg de Trimetoprim de 4 a 7 días dependiendo del criterio del médico veterinario.
Dosis practica: Para agua de bebida en la práctica disolver 140 g de producto en un tanque de 1.000 L de agua. Si se va a preparar junto con el alimento mezclar 700 g de producto para 1 tonelada de alimento.
RECOMENDACIONES PARA EL USO:
• En aves y cerdos debe administrarse en el agua de bebida o en el alimento. • Preparar diariamente soluciones frescas y suministrar como única fuente de bebida.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
• Su uso no se recomienda durante la gestación y lactancia, puesto que no se ha demostrado su seguridad durante estos períodos. • Destruya el empaque después de administrar el producto. • Evite el contacto con los ojos, mucosas y piel, en caso de contacto, lavar con abundante agua y jabón. • El consumo de alimento o agua de bebida depende de la condición fisiológica y clínica del paciente, así como de la etapa productiva en la que se encuentra, para realizar correctamente el cálculo de la dosificación. • Se recomienda realizar pruebas de sensibilidad de las cepas presentes en la explotación mediante cultivo/antibiograma, previo a la administración del producto.

TIEMPO DE RETIRO:
Las aves tratadas destinadas al consumo humano deberán sacrificarse solo después de 10 días finalizado el tratamiento, no se debe administrar el producto a aves ponedoras en producción de huevo para el consumo humano, ni en las 4 semanas anteriores al inicio del período de postura. Los cerdos tratados destinados al consumo humano deberán sacrificarse solo después de 15 días finalizado el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES:
• No usar en animales con disfunción hepática o renal grave.
• No usar en casos de hipersensibilidad conocida a los principios activos o excipientes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura inferior a 30°C resguardado de la luz. La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
No administrar con anticoagulantes, con acidificantes urinarios o con otros medicamentos veterinarios.

PRESENTACIÓN
5 kg, 10kg, 25 kg.

BUENAS PRÁCTICAS DE BPM MANUFACTURA

ANTIMICROBIANO