



UNIMAST 20

Antibacterial

Reg. ICA 5403-DB



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contienen:

Spiramicina base	60'000.000	U.I.
Excipientes C.S.P.	100	ml

USO EN:

Bovinos, Ovinos y Porcinos.

INDICACIONES:

Indicado en el tratamiento de infecciones causadas por *Streptococcus* sp., *Corynebacterium* sp., (mastitis, metritis, neumonías, panadizo) *Mycoplasma* sp., (neumonía enzoótica infecciosa) *Staphylococcus* sp.

DOSIS:

Porcinos: 5 ml x 40 kg
Aves: 0,125 ml x kg

ADMINISTRACIÓN

Intramuscular. Aunque una sola aplicación puede ser suficiente en los casos subclínicos, se recomienda en casos agudos, repetir la inyección a las 24 ó 36 horas en bovinos, ovinos y porcinos.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados, no deben sacrificarse para consumo humano hasta 72 horas después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo, no debe darse para consumo humano.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN

Frasco de 25, 50, 100, 250 y 500 mL.



ANTIMICROBIANO