

VIMEC

Endo-Ectoparasiticidas

Reg. ICA 3904-DB

COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:
Ivermectina .....10 mg
Excipientes C.S.P. ..... 1 ml

USO EN:
Bovinos y Porcinos.

INDICACIONES:
En bovinos y porcinos para el control y tratamiento del parasitismo gastrointestinal, pulmonar y externo. Bovinos Endoparásitos: Ostertagia sp, Haemonchus sp, Mecistocirrus digitatus (adultos), Trichostrongylus colubriformis, Cooperia sp, Bunostomun phlebotomum, Nematodirus sp (adultos), Strongyloides papillosus (adultos), Toxocara vitolurum, Parafilaria bovicola, Thezalia sp (adultos), Oesophagostomum radiatum. Pulmonares: Dictyocaulus viviparus. Ectoparásitos: Linognathus vituli, Solenoptes Capillatus, Haematopinus eurysternus, Psoroptes communis var, bovis, Sarcoptes scabiei var, bovis, Chorioptes bovis, Dermatobia hominis. Ayuda en el control de la garrapata Boophilus microplus. Porcinos Endoparásitos: Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus,Strongyloides ransomi, Oesophagostomum sp, Trichuris suis. Renal: Stephanarus dentatus. Pulmonar: Metastrongylus sp. Ectoparasitos: Haematopinus suis, Sarcoptes scabiei var, suis.

Bovinos	Cerdos	Cerdos jóvenes
(200 µg/kg/P.V 1 ml/50 kg	(300 µg/kg/P.V) 1 ml/33 kg	0,5 ml / 1 kg o menos

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Bovinos: Subcutánea, aplicar adelante o detrás de la articulación escápulo-humeral.
Cerdos: Subcutánea, parte superior del cuello.

TIEMPO DE RETIRO:
Los bovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento y los porcinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento. No aplicar en vacas cuya leche este destinada al consumo humano y no efectuar tratamiento en hembras gestantes 28 días antes del parto..

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura entre 15ºC a 30ºC en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:
Jeringa por 1y 10 ml, frasco por 25, 50,100, 250 y 500 ml.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM