

VIMEC L.A.

Endo-Ectoparasiticidas

Reg. ICA 4778-DB

COMPOSICIÓN: Cada 1 ml contiene:
Ivermectina ..... 10 mg
Excipientes C.S.P. ..... 1 ml

USO EN: Bovinos y Porcinos

DOSIS:
Bovinos: 1 ml de VIMEC L.A. x 50 kg /PV
Porcinos: 1 ml de VIMEC L.A. x 33 kg /PV
Alpacas: 1 ml de VIMEC L.A. x 50 kg /PV

INDICACIONES PARA BOVINOS:
VIMEC L.A, es efectivo en el tratamiento de parásitos gastrointestinales y pulmonares: Ostertagia ostertagi (incluso formas inhibidas), Ostertagia lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Bunostomum phlebotomum, (adultos), Strongyloides papillosus (adultos), Toxocara vitulorum (adultos), Dictyocarus viviparus (incluso formas inhibidas). Tratamiento de ectoparasitos: Dermatobia hominis, Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus. Solenopotes capillatus, Sarcoptes scabiei var, bovis. Ayuda al control del: Damalinia bovis, Chorioptes bovis y Rhipicephalus microplus.

INDICACIONES PARA PORCINOS:
VIMEC L.A es efectivo en el tratamiento de parásitos internos (gastrointestinales, pulmonares, renales) y externos (piojos y ácaros de la sarna). Recomendado para las formas adultas y larvarias de Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum sp., y Stephanurus dentatus y para formas adultas de Strongyloides ransomi, Metastrongylus sp., y Trichuris suis. Control de Haematopinus suis y Sarcoptes scabiei var suis.

INDICACIONES PARA ALPACAS:
VIMEC L.A., es efectivo en el tratamiento de parásitos externos: Sarcoptes scabiei var. Aucheniae.

SOLUCIÓN INYECTABLE LARGA DURACIÓN: Para el tratamiento y control de parásitos internos y externos en bovinos, porcinos y alpacas contra Haemonchus sp., Ostertagia sp., Oesophagostomum sp., Trichos-trongylus sp.

PRECAUCIONES:
No exponer a la luz ni temperaturas superiores a 30º C.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular o subcutánea.

TIEMPO DE RETIRO:
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 42 días después de finalizado el tratamiento. No administrar en animales en producción de leche ni 42 días antes del parto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura inferior a 30°C en un lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:
Frasco por 10, 25, 50, 100 y 500 ml

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM